

## Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. Śląskim

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2014–2017.

Tabela 1. Zachorowania za WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2017 ( dane za 2017 rok do **31 października**)

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ogółem</b>	16	4	9	7	3	<b>287</b>

Tabela 2. Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego w 2017 roku

PSSE	1.01 – 31.10.2017	PSSE	1.01-31.10.2017
Bielsko – Biała	<b>11</b>	Lubliniec	2
Bytom	<b>21</b>	Myszków	<b>3</b>
Chorzów	<b>6</b>	Racibórz	0
Cieszyn	<b>2</b>	Ruda Śląska	<b>19</b>
Częstochowa	<b>5</b>	Rybnik	<b>6</b>
Dąbrowa Górnicza	<b>27</b>	Sosnowiec	<b>119</b>
Gliwice	<b>18</b>	Tychy	<b>17</b>
Jaworzno	<b>7</b>	Wodzisław Śląski	<b>2</b>
Katowice	<b>17</b>	Zawiercie	0
Kłobuck	<b>4</b>	Żywiec	<b>1</b>
<b>Ogółem 287</b>			

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 15 października 2017 r. odnotowano **1909** przypadków WZW A. Dla porównania w analogicznym okresie w 2016 roku było to **29** przypadków.

**Wirusowe zapalenie wątroby typu A** (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

### Do zakażenia może dojść poprzez:

- \_ spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
- \_ kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
- \_ kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W 32 ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 76 zachorowań.

**Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny**, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. **Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka**, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- \_ osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
- \_ osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
- \_ dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.



## CO TO JEST WZW A?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), tzw. choroba „brudnych rąk”.



## JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA WZW A?

- podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
- w wyniku spożycia zakażonej żywności,
- przez spożycie zakażonej wody (także w formie kostek lodu),
- drogą kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.

## ZAPOBIEGAJ! ZASZCZEP SIĘ!

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A

NAJLEPSZYM SPOSOBEM ZAPOBIEGANIA ZACHOROWANIU



## PAMIĘTAJ ABY:

- myć ręce przed każdym posiłkiem i zawsze po wyjściu z toalety,
- utrzymywać właściwe warunki sanitarno-higieniczne przy przygotowaniu posiłków,
- dokładnie myć owoce i warzywa przed spożyciem.



[www.wsse.katowice.pl](http://www.wsse.katowice.pl)